

DÉPLIANT

CANTHACUR-PS^{MD}

(Cantharidine 1%, acide salicylique 30%, podophylline 5%)
Pour usage topique

DESCRIPTION: CANTHACUR-PS^{MD} contient 30% d'acide salicylique, 5% de podophylline et 1% de cantharidine dans un excipient filmogène adhérent.

INGRÉDIENTS NON-MÉDICINAUX: Acétone, colodion, ethoxyethanol, éthylcellulose, huile de ricin, polyoxyéthylène octyl phénol.

INDICATIONS: CANTHACUR-PS est indiqué dans l'enlèvement topique d'excroissances épithéliales bénignes telles que les verrues (verruca vulgaris), tout particulièrement les verrues plantaires, les verrues en mosaïque, les verrues péri-unguérales et les molluscum contagiosum. Recommandé pour le traitement de verrues résistantes et fortement kératinisées. Étant donné qu'il ne laisse aucune cicatrice, CANTHACUR-PS est indiqué pour le traitement des régions découvertes pour lesquelles les résultats esthétiques sont importants. En outre, il est particulièrement indiqué dans le traitement des verrues chez les enfants, car son application n'occasionne aucune douleur et ne nécessite aucun instrument.

MODE D'ACTION: La cantharidine exerce une action vésicante qui provient de son action acantholytique initiale. On présume que son efficacité dans le traitement des verrues découle de cette action acantholytique qui provoque l'«exfoliation» de la tumeur. L'application topique de cantharidine ne laisse aucune cicatrice dû au fait que cette substance exerce une action lytique qui se limite à l'épiderme, ce qui laisse intacte la couche basale et produit donc un effet minimal sur le derme. La podophylline est un agent cytotoxique. Son effet le plus important est l'interférence qu'elle exerce sur la mitose des cellules de la couche basale de l'épiderme. L'acide salicylique est un agent kératolytique puissant.

MISE EN GARDE: CANTHACUR-PS est un vésicatoire puissant qui ne peut être appliqué que par le médecin. Il est recommandé de choisir soigneusement les personnes qui subiront un traitement au CANTHACUR-PS et la méthode utilisée pour ce traitement, méthode que le médecin met au point lui-même. Il faut également choisir avec soin le point d'application car une pigmentation de la région soignée peut subsister dans de rares cas après le traitement. On recommande d'informer les personnes traitées avec ce produit des effets possibles et des conséquences éventuelles reliées à l'emploi de celui-ci. Ne pas appliquer près des yeux, sur le visage, sur une muqueuse ou sur les régions ano-génitales. Ne pas utiliser si l'excroissance ou les tissus environnants sont enflammés ou irrités. Ne pas utiliser chez les diabétiques ou les personnes ayant une mauvaise circulation sanguine. Ne pas appliquer sur tous genres de naevus ou les verrues inathétiques dotées de poils. Il ne faut pas traiter les grandes régions en une seule fois car le désagrement ressenti par la personne traitée peut être trop excessif et une absorption générale peut se produire. L'emploi de CANTHACUR-PS chez les femmes enceintes ou chez celles qui allaitent n'est pas recommandé puisqu'aucune étude bien contrôlée et pertinente n'a été effectuée sur ce sujet. Emploi non recommandé chez les jeunes enfants, car il est difficile de soulager la douleur que peut causer ce médicament.

CONTRE-INDICATIONS: Hypersensibilité aux constituants. Éviter de consommer des boissons alcoolisées pendant plusieurs heures après le traitement.

POSOLOGIE ET ADMINISTRATION: Méthode A (sans curetage): Aucune incision ou aucun traitement antérieur n'est requis. Il faut parfois couper les ongles afin de pouvoir appliquer le médicament sur les verrues sous-unguérales. Appliquer CANTHACUR-PS (une couche seulement) sur la verrue et sur une surface de 1 à 3mm autour de la verrue, à l'aide d'un coton-tige ou d'un bâtonnet-applicateur. Laisser sécher pendant quelques minutes. Couvrir d'un morceau de ruban adhésif non-poreux en plastique. Informer la personne traitée qu'il faut garder le ruban pendant au moins quatre heures (au maximum 24 heures). Dans les 24 heures qui suivent, il se forme une vésicule qui est souvent douloureuse et inflammée. Faire revenir la personne traitée une semaine ou deux plus tard, afin de l'examiner. Enlever le tissu nécrotique et refaire le même traitement si la verrue n'a pas totalement disparu. Permettre la ré-épithélialisation du tissu avant de refaire le traitement.

Méthode B (avec curetage): Même méthode que la méthode A sauf qu'il faut faire revenir la personne traitée au bout de 24 heures afin de procéder au curetage (il peut être nécessaire d'effectuer une anesthésie locale). La méthode B comporte plusieurs avantages: le fait d'exécuter un traitement au CANTHACUR-PS avant de procéder au curetage permet de faciliter l'identification des couches de tissus et de mieux détacher la verrue. En outre, il est rarement nécessaire de refaire le traitement. Faire revenir la personne traitée dans les quatre semaines qui suivent afin de l'examiner (habituellement, la lésion guérit entièrement dans un délai d'une à trois semaines). On recommande d'utiliser un agent antibactérien léger jusqu'à ce que la région traitée soit guérie.

Verrues plantaires: Enlever la kératine qui couvre la verrue; éviter de faire saigner; éviter de couper du tissu vivant. Appliquer CANTHACUR-PS sur la verrue et sur une surface de 1 à 3mm autour de la verrue, à l'aide d'un coton-tige ou d'un bâtonnet-applicateur. Laisser sécher quelques minutes. Couvrir d'un ruban adhésif non-poreux en plastique. Enlever le ruban après une semaine et débrider. Si la verrue n'a pas totalement disparu après débridement, appliquer à nouveau une petite quantité de CANTHACUR-PS et remettre le ruban de la façon mentionnée ci-dessus. De grandes lésions peuvent nécessiter trois traitements ou plus similaires à celui décrit plus haut. Si la verrue a entièrement disparu, le point de guérison est lisse et d'apparence normale.

Molluscum contagiosum: Couvrir chaque lésion d'une mince couche de CANTHACUR-PS. Après une semaine, traiter toute nouvelle lésion de la même manière et traiter à nouveau, au CANTHACUR-PS, toute lésion résistante en couvrant toutefois la lésion avec un petit morceau de ruban occlusif. Il faut enlever le ruban après 6 à 8 heures.

Soulagement de la douleur: Avertir la personne traitée que la vésicule peut être douloureuse et peut durer de 2 à 4 jours. Prescrire un analgésique léger tel que l'ASA ou l'acétaminophène, avec ou sans codéine. Le degré de sensibilité à la cantharidine varie selon les personnes. Il arrive rarement que la personne soignée ressente un picotement, une brûlure ou une sensibilité extrême au point d'application du médicament. Si tel est le cas, pour minimiser la douleur, appliquer une fine couche de CANTHACUR-PS sur la verrue et dire au patient d'enlever le ruban, et de faire tremper la région traitée dans de l'eau fraîche pendant 10 à 15 minutes, pourvu que le médicament ait eu le temps de bien pénétrer dans les tissus. Si la douleur persiste, ponctionner la vésicule à l'aide d'une méthode stérile, appliquer un antiseptique et couvrir d'un sparadril. Il est préférable de ne traiter qu'une ou deux lésions lors de la première visite afin de connaître le degré de sensibilité du patient au médicament.

EFFETS SECONDAIRES INDÉSIRABLES: On a constaté des verrues annulaires après un traitement au CANTHACUR-PS chez un faible pourcentage de personnes traitées. Ces lésions sont superficielles et bien qu'elles inquiètent certaines personnes, elles ne posent généralement que peu de problèmes. Le traitement consiste à rassurer le sujet et à refaire le traitement au CANTHACUR-PS ou avec un autre médicament. On a constaté une fois, un cas de lymphangite chimique, après l'emploi de CANTHACUR-PS en association avec un plâtre d'acide salicylique.

N.B.: CANTHACUR-PS contient des vésicatoires puissants et peut provoquer la formation de vésicules s'il entre en contact avec la peau saine ou une muqueuse. Si on répand CANTHACUR-PS sur la peau, il faut rincer immédiatement à l'acétone, à l'alcool ou au dissolvant à ruban. Laver ensuite vigoureusement à l'eau chaude savonneuse et bien rincer. Si le médicament est répandu sur une muqueuse ou dans les yeux, rincer à l'eau, enlever la pellicule qui s'est formée et rincer à l'eau pendant encore 15 minutes.

PRÉSENTATION: Flacon contenant 7,5 mL. CANTHACUR-PS est très inflammable; tenir éloigné de toute source de chaleur, du feu et des flammes. Reboucher le flacon immédiatement après usage. Conserver le médicament à la température ambiante et à l'abri de la chaleur.



Ce dépliant est recyclable

paladin
une compagnie de endo international

Questions ou commentaires?
Laboratoires Paladin Inc.
St-Laurent, Québec H4M 2P2
1-888-867-7426