

RENSEIGNEMENTS POUR LE CONSOMMATEUR

**ANACIN®**

Comprimés de 325 mg d'acide acétylsalicylique (ASA)  
et 32 mg de caféine

Le présent dépliant n'est qu'un résumé et ne donne donc pas tous les renseignements pertinents au sujet d'ANACIN®. Pour toute question au sujet de ce médicament, communiquez avec votre médecin ou votre pharmacien.

**AU SUJET DE CE MÉDICAMENT**

Les raisons d'utiliser ce médicament:

ANACIN® est utilisé pour le soulagement rapide des maux de tête, de la fièvre, des douleurs d'intensité faible à modérée, des douleurs causées par l'arthrite ou le rhumatisme, des maux de dents et des douleurs des crampes menstruelles.

Les effets de ce médicament:

ANACIN® est utilisé pour le soulagement rapide et efficace de la douleur.

L'ingrédient médicamenteux est:

Acide acétylsalicylique (ASA) et caféine

Les ingrédients non médicinaux importants sont:

Amidon de maïs, cellulose, hypromellose, laurylsulfate de sodium, méthylcellulose, polyéthylène glycol.

Les formes posologiques sont:

ANACIN® est disponible sous forme de comprimés.

**MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS**

Ne pas utiliser ANACIN® si vous:

- êtes allergiques aux salicylates ou à l'un des ingrédients non médicinaux compris dans la formulation;
- êtes allergiques à tout autre médicament anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) ou à tout autre analgésique / réducteur de fièvre;
- avez un ulcère ou des antécédents d'ulcère;
- êtes sujet aux hémorragies;
- avez une maladie rénale ou hépatique grave ou évolutive;
- avez des antécédents d'asthme provoqué par les salicylates ou d'autres médicaments AINS;
- utilisez du méthotrexate aux doses de 15 mg/semaine ou plus;
- êtes au dernier trimestre de votre grossesse.

Ne pas utiliser avec d'autres médicaments renfermant de l'acide acétylsalicylique ou autres salicylates, ou d'autres médicaments AINS (p. ex., ibuprofène, naproxène).

**Mise en garde - hémorragies gastriques:** Ce produit contient un médicament anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) qui peut provoquer de graves hémorragies gastriques.

**Garder hors de la portée des enfants.** Cet emballage contient suffisamment de médicament pour porter gravement atteinte à la santé d'un enfant. Ne pas administrer aux enfants et aux adolescents de moins de 18 ans qui ont la varicelle ou qui présentent des symptômes de grippe avant qu'un médecin ou un pharmacien n'ait été consulté à propos du syndrome de Reye, une maladie rare mais grave signalée comme étant associée à l'acide acétylsalicylique (ASA).

Consultez un médecin ou un pharmacien avant d'utiliser ce médicament si vous:

- avez des antécédents de problèmes gastriques tels que des brûlures d'estomac;
- êtes atteints d'asthme, d'hypertension, de maladie du cœur, du foie ou des reins, de goutte, d'anémie grave ou de toute autre maladie grave;
- êtes atteints de glaucome;
- vous souffrez du syndrome de la vessie hyperactive;
- prenez de l'acétaminophène, des anticonvulsifs, des anticoagulants, des diurétiques, des médicaments pour traiter l'arthrite, le diabète ou la goutte, du méthotrexate, des stéroïdes ou tout autre médicament;
- consommez 3 boissons alcoolisées ou plus par jour;
- essayez de concevoir, êtes enceinte ou allaitez;
- subirez une chirurgie au cours des 5 à 7 prochains jours;
- êtes âgé de 60 ans ou plus.

Consultez un médecin ou un pharmacien si:

- vous douleur dure plus de 5 jours, ou votre fièvre persiste plus de 3 jours;
- de nouveaux symptômes apparaissent ou si de la rougeur ou de l'enflure est présente.

**UTILISATION APPROPRIÉE DE CE MÉDICAMENT**

Comment utiliser ANACIN®

**Posologie pour adulte:** 1 ou 2 comprimés avec un verre (250 mL) d'eau toutes les 4 à 6 heures. Ne pas dépasser 12 comprimés par période de 24 heures.

Ne pas dépasser la dose recommandée à moins d'avis contraire de votre médecin. Utiliser la dose minimale efficace.

Évitez tout autre produit contenant de la caféine. Trop de caféine peut causer une fréquence cardiaque rapide, de la nervosité ou de l'insomnie.

**En cas de surdosage:** appelez immédiatement un centre anti-poison ou un médecin, même si vous n'avez remarqué aucun signe ou symptôme.

**EFFETS SECONDAIRES GRAVES ET PROCÉDURES À SUIVRE**

Arrêter l'utilisation et consulter un médecin si l'un des effets suivants se manifeste:

- réaction allergique pouvant inclure les symptômes suivants: démangeaisons, éruptions cutanées ou urticaires, respiration sifflante ou difficulté à respirer, enflure au visage;
- Vous présentez l'un des signes suivants d'hémorragie gastrique:
  - vous vous sentez faible, vomissez du sang, avez des selles noires ou ensanglantées;
  - vous avez des maux d'estomac qui ne s'améliorent pas;
- toute diminution de l'ouïe, y compris les bourdonnements d'oreilles.

**COMMENT CONSERVER LE MÉDICAMENT**

Garder hors de la portée des enfants.

Conserver à température ambiante (15 °C à 30 °C).

**DÉCLARATION DES EFFETS INDÉSIRABLES SOUPÇONNÉS**

Vous pouvez déclarer les effets indésirables soupçonnés associés à l'utilisation des produits de santé au Programme Canada Vigilance de l'une des 3 façons suivantes:

- En ligne [www.santecanada.gc.ca/medeffet](http://www.santecanada.gc.ca/medeffet)
- Par téléphone, en composant le numéro sans frais 1-866-234-2345;
- En remplissant un formulaire de déclaration de Canada Vigilance et en le faisant parvenir
  - par télécopier, au numéro sans frais 1-866-678-6789
  - par la poste au:
    - Programme Canada Vigilance
    - Santé Canada
    - Indice postal 0701D
    - Ottawa (Ontario) K1A 0K9

Les étiquettes préaffranchies, le formulaire de déclaration de Canada Vigilance ainsi que les lignes directrices concernant la déclaration d'effets indésirables sont disponibles sur le site Web de MedEffet<sup>MC</sup> Canada à [www.santecanada.gc.ca/medeffet](http://www.santecanada.gc.ca/medeffet).

**REMARQUE:** Pour obtenir des renseignements relatifs à la gestion des effets secondaires, veuillez communiquer avec votre professionnel de la santé. Le Programme Canada Vigilance ne fournit pas de conseils médicaux.

**POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS**

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec le promoteur, Laboratoires Paladin Inc., au 1-888-867-7426.

Ce dépliant a été rédigé par Laboratoires Paladin Inc.



Laboratoires Paladin Inc.  
St-Laurent, QC H4M 2P2

Dernière révision: août 2017

301613-01

